

Taux de prévalence contraceptive des femmes de 15 à 49 ans, par caractéristiques sociodémographiques

Caractéristiques sociodémographiques	Toutes méthodes		Méthodes modernes ¹		Méthodes traditionnelles	
	Toutes les femmes	Femmes en union ²	Toutes les femmes	Femmes en union ²	Toutes les femmes	Femmes en union ²
Nombre	1276	812	1276	812	1276	812
Total	20,1	29,8	18,8	27,8	1,3	2,0
Age						
15–19	2,7	12,2	2,2	9,3	0,5	2,8
20–24	25,3	36,2	23,6	33,6	1,7	2,6
25–29	26,2	31,8	25,3	30,7	0,9	1,1
30–34	28,2	30,8	25,4	27,5	2,8	3,4
35–39	33,9	38,7	33,2	37,9	0,7	0,8
40–44	20,5	23,9	18,2	21,2	2,3	2,7
45–49	8,7	12,0	8,7	12,0	0,0	0,0
Statut matrimonial						
En union ²	29,8	na	27,8	na	2,0	na
Non mariée, sexuellement active	30,5	na	30,5	na	0,0	na
Nombre d'enfants						
0–1	8,9	19,3	8,5	18,1	0,5	1,2
2–3	34,0	36,3	31,0	32,9	3,1	3,3
4 ou plus	29,4	32,3	28,1	30,9	1,3	1,4
Niveau d'études						
Jamais scolarisée	21,6	25,1	19,2	22,2	2,4	2,9
Primaire	21,8	29,0	21,1	28,0	0,7	1,0
Secondaire	17,5	36,7	17,0	35,5	0,5	1,2
Tertiaire	20,5	37,9	19,0	35,2	1,4	2,7
Tertile de bien-être économique						
Faible	16,8	19,2	16,8	19,2	0,0	0,0
Intermédiaire	13,2	14,4	13,2	14,4	0,0	0,0
Elevé	20,7	31,4	19,3	29,1	1,4	2,2

¹ Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculins et féminin, la méthode des jours fixes, et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée

² "En union" comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na = non applicable

XX: Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées