



PMA2016/BURKINA FASO VAGUE 4

APERÇU DES INDICATEURS

Résumé de la méthode d'échantillonnage de la Vague 4 de PMA2016/Burkina Faso :

PMA2020 est conçu pour créer des sites sentinelles pour la collecte de données auprès de la population et des sites de prestation de santé (SPS). Les zones de dénombrement (ZD) sélectionnées pour la Vague 1 sont généralement utilisées pour la collecte de données des Vagues 2-4. Les ménages au sein de la ZD sont échantillonnés au hasard lors de chaque cycle d'enquête; cependant, la ZD demeure la même pour toutes les vagues de collecte de données. Pour une meilleure compréhension de la méthode d'échantillonnage de la Vague 4, celle originale de la Vague 1 est résumée ci-dessous.

PMA2020 utilise une conception d'enquête par grappes en deux phases avec des strates par zones résidentielles (urbaines et rurales). La première phase de l'échantillonnage consiste à sélectionner des grappes dans chaque strate en utilisant un échantillonnage avec probabilité proportionnelle à la taille. L'échantillon a été conçu pour générer des estimations nationales du taux de prévalence contraceptive moderne (TPCm) de toutes les femmes avec Une marge d'erreur inférieure à 3 % et des estimations urbaines/rurales avec une marge d'erreur inférieure à 5%.

Le tableau ci-dessous présente les principaux indicateurs de planification familiale au niveau national, et leur répartition par caractéristiques sociodémographique. La désagrégation par distinction urbaine/rurale a été faite dans la mesure du possible. **Pour visualiser la distribution des indicateurs par caractéristiques sociodémographiques des répondantes, cliquez sur le lien de l'indicateur correspondant. La distribution des répondantes selon leurs caractéristiques sociodémographiques est [disponible ici](#). La distribution des SPS est [disponible ici](#). Des détails supplémentaires sur la conception de l'échantillon, la collecte et le traitement des données, les taux de réponse et les erreurs types sont disponibles sous les tableaux d'indicateurs.**

Indicateurs standards de PMA2020 sur la planification familiale

Vague 3

Toutes
femmes

Femmes
en union

L'utilisation:

Utilisation de la contraception

Taux de Prévalence Contraceptive (TPC)	22,8	25,5
Taux de Prévalence Contraceptive Moderne (TPCM)	21,5	24,2
Méthodes traditionnelles	1,3	1,3

Distribution des méthodes contraceptives

[Distribution des méthodes contraceptives \(diagrammes à barres empilés pour les femmes en union et toutes les femmes\)](#)

La demande:

<u>Besoins non satisfaits en planification familiale</u>	24,2	29,3
<u>Demande de planification familiale</u>	53,0	69,0
Pourcentage de la demande de planification familiale satisfaite par une méthode moderne	45,8	44,2

Pourcentage de naissances récentes, par intention

Souhaitée à ce moment	69,2	69,9
Souhaitée plus tard	27,5	26,8
Non Souhaitée	3,3	3,3

L'accès, l'équité, la qualité et le choix:

<u>Pourcentage d'utilisatrices ayant décidé de leur méthode actuelle conjointement avec leur partenaire</u>	91,1	92,3
---	------	------

ou l'agent de santé

<u>Pourcentage d'utilisatrices ayant payé des frais pour les services de planification familiale</u>	66,4	68,4
--	------	------

Composantes de l'indice d'information sur les méthodes

Pourcentage des utilisatrices actuelles ou récentes ayant été informées sur d'autres méthodes contraceptives	61,9	65,9
--	------	------

Pourcentage des utilisatrices actuelles ou récentes ayant été informées sur les effets secondaires	56,6	60,1
--	------	------

Pourcentage des utilisatrices actuelles ou récentes ayant été informées sur ce qu'il faut faire en cas d'effets secondaires	85,7	85,4
---	------	------

<u>Pourcentage d'utilisatrices actuelles ou récentes qui retourneraient voir le même prestataire ou le recommanderaient</u>	75,7	77,8
---	------	------

<u>Pourcentage des utilisatrices actuelles ou récentes ayant reçu des informations sur la planification familiale au cours des 12 derniers mois</u>	14,9	17,0
---	------	------

Indicateurs au niveau des sites de prestation de santé:

Faisant payer des frais pour les services de planification familiale

Choix contraceptive: Disponibilité de au moins 3 ou 5 méthodes contraceptives modernes

Choix contraceptif: Disponibilité de la contraception moderne, par méthode

Ruptures de stock de contraceptifs, par méthode

Nombre total de consultations pour des services de contraception, par type de méthode

L'Enquête de PMA2016/Burkina Faso Vagues 3 en détail

Echantillonnage

Conception de l'échantillon de la Vague 1

L'enquête PMA2020 recueille des données chaque année pour permettre l'estimation d'indicateurs clés afin de suivre les progrès de la planification familiale. Le modèle d'enquêtrice résidente (ER) permet la réplication des enquêtes deux fois par an pendant les deux premières années, et annuellement pour les années subséquentes, afin de suivre les progrès.

Les ressources de l'enquête ont permis de cibler une taille d'échantillon de 53 zones de dénombrement (ZD) et une taille d'échantillon prévue de 1855 ménages. Pour la première vague de collecte de données, 53 ZD ont été échantillonnées au total dans toutes les régions du Burkina Faso, créant des estimations représentatives au niveau national et urbain/rural. Les unités d'échantillonnage primaires pour l'enquête étaient les ZD, créées lors du Recensement de la population et du logement de 2006. Les ZD ont été sélectionnées systématiquement avec une probabilité proportionnelle à la taille dans les strates urbaines/rurales. L'Institut Supérieur des Sciences de la Population (ISSP) a fourni l'échantillon et les probabilités de sélection avec le soutien de l'Institut national de la statistique et de la démographie (INSD).

Dans chaque ZD sélectionnée, les superviseurs de terrain ont choisi au hasard jusqu'à trois sites de prestation de santé (SPS) privés devant être interrogés par une enquêtrice résidente en utilisant le questionnaire SPS. Les superviseurs de terrain eux-mêmes ont appliqué les questionnaires SPS dans trois SPS publics desservant chaque ZD, soit les SPS au premier, deuxième et troisième niveau le plus bas du système de santé public désignés pour servir chaque ZD.

Actualisation de l'échantillon pour la Vague 4

La quatrième vague de collecte des données a continué dans les mêmes zones de dénombrement (ZD) que la Vague 3. Dans la mesure où la Vague 4 s'est déroulée environ six mois après la Vague 3, la cartographie et le recensement/dénombrement n'ont pas été répétés pour la Vague 4. La liste des ménages de la Vague 3 a été utilisée pour sélectionner l'échantillon.

Les superviseurs de terrain ont sélectionné au hasard 35 ménages à partir de la liste des ménages. Un tableau du ménage a été rempli pour chacun des ménages et toutes les femmes éligibles de 15-49 ans dans les ménages sélectionnés ont été approchées et invitées à donner leur consentement éclairé pour participer à l'étude.

La majorité des Sites de Prestation de Santé (SPS) ont été ré-interviewés lors de cette vague d'enquête, formant une étude par panel. Lorsqu'une ZD avait plus de trois SPS privés, identifiés au cours du dénombrement, trois SPS privés ont été sélectionnés au hasard pour chaque vague d'enquête.

Questionnaires

PMA2020 utilise des questionnaires standardisés pour les ménages, les femmes, et les SPS afin de recueillir des données comparables entre les 11 pays participant au programme et avec les enquêtes nationales existantes. Avant le lancement de l'enquête dans chaque pays, ces questionnaires sont révisés et affinés par des experts locaux afin de s'assurer que toutes les questions soient adaptées à chaque contexte. Tous les questionnaires ont déjà été traduits en français, la langue nationale du Burkina Faso, et les traductions ont été examinées pour en vérifier la pertinence.

Le [questionnaire ménages](#), le [questionnaire femmes](#), et le [questionnaire SPS \(sites de prestation de santé\)](#) sont basés sur des enquêtes modèles conçues par le personnel de PMA2020 à l'Institut Bill et Melinda Gates pour la Population et la Santé de la Reproduction à l'École de Santé Publique Bloomberg de l'Université de Johns Hopkins, ainsi que l'Institut Supérieur des Sciences de la Population (ISSP) de l'Université de Ouagadougou, et à l'aide du matériel de terrain de l'Enquête Démographique et de Santé au Burkina Faso (EDS).

Tous les questionnaires PMA2020 sont administrés en utilisant le logiciel Open Data Kit (ODK) installé sur Smartphones Android. Étant donné que les questionnaires PMA2020 sont généralement administrés dans les langues locales (français non inclus), les superviseurs et les ER ont travaillé en petites équipes pendant la formation précédant la collecte des données pour déterminer les traductions orales standard dans toutes les langues locales parlées par les ER. Les entretiens ont été effectués dans la langue locale, ou en français dans les cas où la répondante ne parlait pas couramment la langue locale, ou si l'ER ne parlait pas la langue maternelle de la répondante, ou encore si la répondante était plus à l'aise en français. Les enquêteurs résidant dans chaque ZD ont administré les questionnaires ménages et femmes dans les ménages sélectionnés.

Le questionnaire ménages regroupe des informations de base sur le ménage, telles que la propriété de biens durables, ainsi que les caractéristiques de l'unité d'habitation, y compris les murs, le sol et le toit, les sources d'eau et les installations d'assainissement. Ces informations servent à construire un quintile de bien-être économique.

La première section du questionnaire ménages, le tableau du ménage, énumère les informations démographiques de base sur tous les membres habituels du ménage et les visiteurs qui ont séjourné chez le ménage la nuit avant l'entrevue. Cette liste sert à identifier les répondantes éligibles au questionnaire femmes. En plus du tableau de recensement, le questionnaire ménages rassemble également des données qui permettront de mesurer les principaux indicateurs d'eau, d'assainissement et d'hygiène (WASH), y compris les sources régulières et les utilisations des installations sanitaires, et la prévalence de la défécation à l'air libre par les membres du ménage.

Le questionnaire femmes est utilisé pour recueillir des informations auprès de toutes les femmes de 15 à 49 ans qui ont été recensées dans le tableau des ménages sélectionnés. Le

questionnaire femmes rassemble des informations spécifiques sur l'éducation ; la fécondité et les préférences de fécondité ; l'accès, le choix et l'utilisation de la planification familiale ; la qualité des services de planification familiale ; l'exposition aux messages de planification familiale dans les médias ; et la charge de la collecte de l'eau pour les femmes.

Le questionnaire SPS sert à recueillir des informations sur la prestation et la qualité des services et des produits de santé reproductive, l'intégration des services de santé, et l'eau et l'assainissement dans les SPS.

Formation, collecte et traitement des données

Formation

La formation au travail de terrain de PMA2020/Burkina Faso-V4 a débuté le 8 novembre 2016 par une session de cinq jours destinée aux nouvelles enquêtrices résidentes (ER), suivie d'une formation de recyclage de cinq jours pour tous les membres continus de l'équipe du projet : huit superviseurs de terrain, trois membres de l'équipe centrale, et 83 ER. L'équipe du projet PMA2020 à l'Institut Supérieur des Sciences de la Population (ISSP) a dirigé à la fois la nouvelle formation et celle de recyclage, avec le soutien présentiel et à distance de l'Institut Bill & Melinda Gates pour la Population et la Santé de la Reproduction à l'École de Santé Publique Bloomberg de l'Université de Johns Hopkins. La formation s'est tenue à Ouagadougou, dans les locaux de l'ISSP, au sein de l'Université de Ouagadougou.

S'agissant d'une formation de recyclage pour le personnel permanent ou ayant déjà travaillé pour projet, la formation s'est focalisée sur une série de nouvelles questions ajoutées via le processus de révision annuelle des questionnaires PMA2020, ainsi que sur une nouvelle section développée en collaboration avec FHI 360 pour explorer l'acceptabilité de nouveaux dispositifs contraceptifs chez les femmes en âge de procréer au Burkina Faso. La formation s'est également concentrée sur une révision du questionnaire des Sites de Prestation de Santé (SPS), et sur une révision du contenu et du protocole de l'enquête.

Pendant la formation, la performance des ER et des superviseurs a été évaluée via des quizz sur téléphone, des exercices pratiques de terrain pour l'enquête SPS, et en fonction de la participation en classe. La formation a compris une demi-journée d'exercices pratiques, pendant lesquels les participants se sont rendus dans une zone de dénombrement (ZD) d'entraînement pour mener des interviews auprès d'un SPS. La formation a été menée principalement en français, mais certaines sessions de groupes ont été conduites dans les langues locales parlées par les ER et leurs superviseurs.

Collecte et traitement des données

La collecte de données a été menée entre novembre 2016 et janvier 2017. Contrairement aux enquêtes traditionnelles sur papier, PMA2020 utilise le logiciel Open Data Kit (ODK) Collect, une application logicielle open source, pour collecter des données sur téléphones portables. Tous les questionnaires ont été programmés à l'aide de ce logiciel et installés sur tous les Smartphones du projet. Les formulaires ODK sont programmés avec des sauts de questions automatiques et des

contraintes de réponse intégrées pour réduire les erreurs de saisie de données.

L'application ODK a permis aux ER et aux superviseurs de collecter et transférer des données d'enquête vers un serveur central d'ODK Aggregate. Cette agrégation instantanée des données a également permis le traitement simultané de celles-ci et des corrections de cours pendant que PMA2020 était encore actif sur le terrain. Tout au long de la collecte des données, le personnel central de l'ISSP à Ouagadougou, au Burkina Faso, et le gestionnaire de données à l'Institut Gates à l'Université de Johns Hopkins à Baltimore, dans le Maryland, ont régulièrement surveillé les données entrantes et les agents de terrain ont été notifiés de toute erreur potentielle, des données manquantes ou des problèmes trouvés concernant les formulaires envoyés sur le serveur central. L'utilisation des téléphones portables a permis de fusionner la collecte et la saisie de données en une seule étape; par conséquent, la saisie des données a été terminée lorsque le dernier formulaire a été téléchargé à la fin de la collecte de données en mai.

Une fois toutes les données sur le serveur, les analystes des données ont épuré et dé-identifier les données, effectué les pondérations nécessaires et préparé la base de données finale pour l'analyse à l'aide du logiciel Stata® version 14. L'analyse des données en vue de la diffusion nationale des résultats préliminaires a été menée entre novembre 2016 et janvier 2017. Un petit événement de dissémination des résultats de la Vague 4 s'est tenu avec le Groupe Technique sur la Santé de la Reproduction (GT/SR) à l'ISSP à Ouagadougou, au Burkina Faso, au début du mois de juin 2017.

Taux de réponses

Le tableau ci-dessous présente les taux de réponse pour les répondants des questionnaires ménages et femmes par lieu de résidence (rural/urbain) pour le cycle PMA2016/Burkina Vague 4. Un total de 2904 ménages ont été sélectionnés pour l'enquête PMA2016; 2807 ménages étaient occupés au moment du travail de terrain. 98,0% (2751) des ménages occupés ont consenti à répondre au questionnaire ménages. Le taux de réponse des ménages était plus élevé dans les régions rurales (99,2%) que dans les zones de dénombrement urbaines (96,8%).

Dans les ménages occupés ayant participé à l'enquête, un total de 3352 femmes éligibles de 15 à 49 ans ont été identifiées. Au total, 95,6% des femmes éligibles étaient disponibles et ont consenti à participer à l'étude. Le taux de réponse féminin était plus élevé dans les régions rurales (97,3%) que dans les ZD urbaines (93,8%). Seules les femmes de facto sont incluses dans les analyses PMA; la taille de l'échantillon final des femmes de facto était de 3261 (non pondérée). L'échantillon des sites de prestation de santé (SPS) comprenait 135 interviews de structures sanitaires, dont 131 ont été terminées, pour un taux de réponse de 97,0%.

Les pondérations ont été ajustées en fonction des non-réponses aux niveaux des ménages et des personnes, et appliquées à toutes les estimations relatives aux ménages et aux personnes dans ce rapport. Les estimations des SPS ne sont pas pondérées.

PMA2016/Burkina Faso Vague 4

Result	Urbain	Rural	Total
Enquêtes ménages			
Ménages sélectionnés	1435	1469	2904
Ménages occupés	1385	1422	2807
Ménages interviewés	1340	1411	2751
Taux de réponses des ménages* (%)	96,8	99,2	98,0

Enquêtes auprès des femmes âgées de 15 à 49 ans

Nombre de femmes éligibles**	1663	1689	3352
Nombre de femmes éligibles interviewées	1560	1643	3203
Taux de réponses des femmes† (%)	93,8	97,3	95,6

*Taux de réponse des ménages=nombre de ménages interviewés / nombre de ménages ayant terminé l'entretien

**Taux de réponses des femmes éligibles inclut seulement les femmes identifiées dans les ménages ayant répondu à l'enquête ménage

†Taux de réponse des femmes éligibles=nombre de femmes éligibles enquêtées/nombre de femmes éligibles

Les erreurs de sondage

Le tableau suivant illustre les erreurs de sondage pour les indicateurs de PMA2020 cités ci-dessus. Pour plus d'informations sur les indicateurs de PMA2020, y compris les types d'estimation et la population de base, [veuillez cliquer ici](#).

Variable	Valeur[R]	Ecart-type (ET)	Intervalle de confiance	
			R-2ET	R+2ET
Toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans				
Utilisatrices actuelles de méthodes modernes	0,219	0,012	0,194	0,244
Utilisatrices actuelles de méthodes traditionnelles	0,010	0,002	0,005	0,014
Utilisatrices actuelles de la contraception	0,228	0,013	0,203	0,254
Utilisatrices actuelles de l'injectable	0,070	0,007	0,056	0,083
Utilisatrices actuelles du préservatif masculin	0,022	0,003	0,015	0,029
Utilisatrices actuelles de l'implant	0,100	0,008	0,083	0,116
A choisi sa méthode elle-même ou avec son partenaire/prestataire au cours des 12 derniers mois	0,912	0,015	0,882	0,943
A payé pour un service de planification familiale dans les 12 derniers mois	0,637	0,027	0,584	0,691
A été informée par le prestataire sur d'autres méthodes contraceptives	0,622	0,034	0,553	0,690
A été informée par le prestataire sur les effets secondaires	0,551	0,033	0,485	0,617
Satisfaite du prestataire : reviendrait et le recommanderait à une amie ou un membre de sa famille	0,820	0,030	0,761	0,879
Visitée par un professionnel de la santé qui lui a parlé de la planification familiale au cours des 12 derniers mois	0,196	0,021	0,154	0,239
Femmes en union âgées de 15 à 49 ans				
Utilisatrices actuelles de méthodes modernes	0,245	0,015	0,215	0,275

Utilisatrices actuelles de méthodes traditionnelles	0,009	0,002	0,005	0,013
Utilisatrices actuelles de la contraception	0,254	0,016	0,223	0,285
Utilisatrices actuelles de l'injectables	0,085	0,008	0,068	0,101
Utilisatrices actuelles du préservatif masculin	0,009	0,002	0,005	0,013
Utilisatrices actuelles de l'implant	0,118	0,010	0,098	0,139
A choisi sa méthode elle-même ou avec son partenaire/prestataire au cours des 12 derniers mois	0,919	0,014	0,891	0,948
A payé pour un service de planification familiale dans les 12 derniers mois	0,671	0,027	0,617	0,724
A été informée par le prestataire sur les autres méthodes contraceptives	0,647	0,033	0,582	0,713
A été informée par le prestataire sur les effets secondaires	0,571	0,035	0,500	0,641
Satisfaite du prestataire : reviendrait et le recommanderait à une amie ou un membre de sa famille	0,837	0,028	0,781	0,893
Visitée par un professionnel de la santé qui lui a parlé de la planification familiale au cours des 12 derniers mois	0,227	0,026	0,176	0,279

Caractéristiques sociodémographiques des répondantes

Distribution (en pourcentage) des caractéristiques sociodémographique des femmes de 15 à 49 ans

Caractéristiques contextuelles	Pourcentage	Nombre pondéré	Nombre non pondéré
Age			
15–19	21,9	705	715
20–24	17,3	559	569
25–29	17,3	558	567
30–34	14,5	466	459
35–39	12,7	409	385
40–44	9,2	295	292
45–49	7,1	229	216
Statut matrimonial			
Mariée	68,6	2209	2020
Vivre ensemble	7,0	226	204
Divorcée	1,7	54	75
Veuve	2,5	80	85
Jamais mariée	20,2	652	819
Nombre d'enfants			
0	22,5	726	856
1-2	25,2	812	836
3-4	21,5	692	691
5 ou plus	30,8	991	819
Lieu de résidence			
Urbain	23,6	761	1560
Rural	76,4	2460	1643
Niveau d'études			
Jamais scolarisée	64,5	2078	1766
Primaire	16,1	520	570
Secondaire 1er Cycle	14,5	466	606
Secondaire 2ème Cycle	2,7	88	143
Tertiaire	2,2	70	118
Tertile de bien-être économique			
Faible	34,6	1114	842
Intermédiaire	32,5	1047	817
Elevé	32,9	1060	1544
Total	100,0	3221	3203

Distribution des méthodes contraceptives

Distribution des utilisatrices de la contraception de 15 à 49 ans, par méthode et par caractéristiques sociodémographiques

Caractéristiques sociodémographiques	Toutes les utilisatrices Nombre = 843									
	Stérilisation	Implant	DIU	Injectable	Pilule	Contraception d'urgence	Préservatif masculin	Autres méthodes modernes	Autres méthodes traditionnelles	Total
Total	0,1	43,4	3,1	29,6	10,7	0,4	8,2	0,2	4,1	100,0
Age										
15–19	0,0	42,5	0,0	32,3	2,8	0,0	20,3	0,0	2,0	100,0
20–24	0,0	43,2	1,7	29,0	7,3	1,0	11,3	0,0	6,5	100,0
25–29	0,0	37,0	2,3	35,7	13,2	0,6	9,9	0,5	0,9	100,0
30–34	0,0	42,4	4,2	31,6	15,0	0,0	3,1	0,0	3,6	100,0
35–39	0,0	49,7	5,6	25,9	9,6	0,8	2,8	0,0	5,6	100,0
40–44	0,0	47,5	4,0	21,8	15,9	0,0	4,5	1,1	5,1	100,0
45–49	3,5	52,4	4,9	17,1	4,2	0,0	8,9	0,0	9,0	100,0
Statut matrimonial										
En union ¹	0,0	46,4	3,4	32,2	11,0	0,1	3,1	0,3	3,5	100,0
Non mariée, sexuellement active	0,0	17,3	1,3	21,9	12,3	0,9	39,8	0,0	6,5	100,0
Nombre d'enfants										
0–1	0,0	32,8	2,3	24,0	10,2	1,7	22,0	0,4	6,6	100,0
2–3	0,0	45,0	3,5	32,1	9,4	0,0	7,0	0,0	3,1	100,0
4 ou plus	0,3	48,7	3,3	31,4	11,8	0,0	1,0	0,2	3,4	100,0
Lieu de résidence										
Urbain	0,4	30,5	7,0	16,2	15,8	1,2	19,7	0,6	8,7	100,0
Rural	0,0	51,0	0,8	37,5	7,7	0,0	1,5	0,0	1,5	100,0
Niveau d'études										
Jamais scolarisée	0,0	50,5	2,4	36,5	7,1	0,0	1,3	0,0	2,4	100,0
Primaire	0,0	42,3	2,1	28,4	16,4	0,0	8,7	0,5	1,6	100,0
Secondaire 1er Cycle	0,9	37,1	3,8	19,7	16,7	0,8	13,9	0,4	6,6	100,0
Secondaire 2er Cycle	0,0	20,3	3,5	12,6	9,7	2,5	32,6	1,1	17,6	100,0
Tertiaire	0,0	6,7	14,1	1,4	10,2	4,6	47,7	0,0	15,3	100,0
Tertile de bien-être économique										
Faible	0,0	48,7	1,3	40,4	6,6	0,0	0,5	0,0	2,6	100,0
Intermédiaire	0,0	52,7	1,0	35,6	7,6	0,0	2,4	0,0	0,7	100,0
Elevé	0,3	34,8	5,5	19,3	15,1	1,0	16,5	0,5	7,1	100,0

¹“En union” comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

XX: Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Caractéristiques sociodémographiques	Utilisatrices en union ¹									
	N = 661									
	Stérilisation	Implant	DIU	Injectable	Pilule	Contraception d'urgence	Préservatif masculin	Autres méthodes modernes	Autres méthodes traditionnelles	Total
Total	0,0	46,4	3,4	32,2	11,0	0,1	3,1	0,3	3,5	100,0
Age										
15–19	0,0	52,1	0,0	42,4	3,6	0,0	1,8	0,0	0,0	100,0
20–24	0,0	53,6	1,9	34,4	5,8	0,0	0,3	0,0	3,9	100,0
25–29	0,0	38,8	2,3	38,6	13,3	0,6	4,8	0,6	1,0	100,0
30–34	0,0	43,1	4,2	33,1	14,3	0,0	2,1	0,0	3,3	100,0
35–39	0,0	49,1	5,6	26,6	10,2	0,0	2,5	0,0	6,0	100,0
40–44	0,0	46,9	4,2	22,8	16,1	0,0	4,9	1,2	4,0	100,0
45–49	0,0	51,9	5,5	17,7	4,8	0,0	10,0	0,0	10,2	100,0
Statut matrimonial										
En union ¹	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na
Non mariée, sexuellement active	0,0	0,0	0,0	na	na	na	na	na	na	na
Nombre d'enfants										
0–1	0,0	44,0	3,2	33,1	10,5	0,8	2,5	0,7	5,1	100,0
2–3	0,0	44,0	3,5	32,7	9,5	0,0	7,0	0,0	3,3	100,0
4 ou plus	0,0	48,4	3,4	31,6	12,0	0,0	1,0	0,2	3,2	100,0
Lieu de résidence										
Urbain	0,0	34,8	9,1	20,2	18,1	0,5	8,7	0,8	7,9	100,0
Rural	0,0	51,5	0,9	37,6	7,9	0,0	0,5	0,0	1,6	100,0
Niveau d'études										
Jamais scolarisée	0,0	50,6	2,5	36,9	6,8	0,0	1,0	0,0	2,2	100,0
Primaire	0,0	42,1	2,5	30,0	17,9	0,0	5,0	0,6	1,9	100,0
Secondaire 1er Cycle	0,0	40,5	5,2	19,9	21,1	0,0	5,9	0,5	6,8	100,0
Secondaire 2er Cycle	0,0	33,5	2,7	19,3	11,7	0,0	7,6	2,2	23,0	100,0
Tertiaire	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Quintile de bien-être économique										
Faible	0,0	48,9	1,4	40,4	6,1	0,0	0,4	0,0	2,8	100,0
Intermédiaire	0,0	53,2	1,1	36,3	8,2	0,0	0,6	0,0	0,5	100,0
Élevé	0,0	39,4	6,7	22,9	16,9	0,3	6,9	0,6	6,3	100,0

¹“En union” comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

XX: Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

--: Moins de 25 observations non pondérées

Taux de prévalence contraceptive des femmes de 15 à 49 ans, par caractéristiques sociodémographiques


Caractéristiques sociodémographiques	Toutes méthodes		Méthodes modernes ¹		Méthodes traditionnelles	
	Toutes les femmes	Femmes en union ²	Toutes les femmes	Femmes en union ²	Toutes les femmes	Femmes en union ²
Nombre	3221	2436	3221	2436	3221	2436
Total	22,9	25,4	21,9	24,5	0,9	0,9
Age						
15–19	10,0	16,5	9,8	16,5	0,2	0,0
20–24	27,4	24,6	25,6	23,6	1,8	1,0
25–29	28,0	26,8	27,8	26,6	0,2	0,3
30–34	30,9	31,7	29,8	30,7	1,1	1,1
35–39	27,4	28,0	25,8	26,3	1,5	1,7
40–44	24,1	26,0	22,9	24,9	1,2	1,0
45–49	12,8	13,5	11,6	12,1	1,2	1,4
Statut matrimonial						
En union ²	25,4	na	24,5	na	0,9	na
Non mariée, sexuellement active	41,4	na	38,7	na	2,7	na
Nombre d'enfants						
0–1	17,2	21,4	16,1	20,3	1,1	1,1
2–3	26,5	26,3	25,7	25,4	0,8	0,9
4 ou plus	25,6	26,5	24,8	25,7	0,9	0,9
Lieu de résidence						
Urbain	35,8	44,3	32,7	40,8	3,1	3,5
Rural	18,8	21,3	18,6	21,0	0,3	0,3
Niveau d'études						
Jamais scolarisée	19,5	20,9	19,1	20,5	0,5	0,5
Primaire	29,2	34,4	28,8	33,7	0,5	0,7
Secondaire 1er Cycle	24,0	45,4	22,4	42,3	1,6	3,1
Secondaire 2ème Cycle	39,8	53,5	32,8	41,1	7,0	12,3
Tertiaire	45,8	56,0	38,7	47,2	7,0	8,9
Tertile de bien-être économique						
Faible	19,0	21,5	18,5	20,9	0,5	0,6
Intermédiaire	18,3	20,7	18,1	20,6	0,1	0,1
Elevé	31,4	36,6	29,2	34,3	2,2	2,3

¹Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculins et féminin, la méthode des jours fixes, et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée

² "En union" comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na = non applicable

Distribution des utilisatrices de la contraception de 15 à 49 ans



Besoins non satisfaits en planification familiale

Besoins non satisfaits en planification familiale : Pourcentage des femmes de 15 à 49 ans ayant un besoin non satisfait en planification familiale, par statut matrimonial et caractéristiques sociodémographiques

Caractéristiques sociodémographiques	Toutes les femmes			Femmes en union ¹		
	3221			2436		
Nombre	Pour espacer	Pour limiter	Total	Pour espacer	Pour limiter	Total
Total	20,0	4,4	24,4	23,4	5,4	28,8
Age						
15–19	15,4	1,0	16,4	25,7	0,9	26,6
20–24	27,8	0,7	28,5	32,6	0,9	33,4
25–29	27,1	0,8	27,9	28,0	0,9	28,9
30–34	23,4	3,9	27,3	24,8	4,2	29,0
35–39	20,1	9,2	29,4	21,6	9,2	30,8
40–44	9,8	16,8	26,6	10,3	18,8	29,1
45–49	4,3	9,1	13,4	5,1	10,6	15,7
Statut matrimonial						
En union ¹	23,4	5,4	28,8	na	na	na
Non mariée, sexuellement active	40,9	2,4	43,2	na	na	na
Nombre d'enfants						
0–1	16,9	0,5	17,3	25,4	0,4	25,8
2–3	25,9	1,6	27,5	26,8	1,3	28,1
4 ou plus	19,4	9,4	28,8	20,6	9,8	30,5
Lieu de résidence						
Urbain	11,0	2,6	13,6	14,1	4,1	18,2
Rural	22,8	5,0	27,8	25,4	5,7	31,1
Niveau d'études						
Jamais scolarisée	22,6	6,0	28,6	24,4	6,3	30,7
Primaire	19,3	2,1	21,4	23,7	2,7	26,5
Secondaire 1 Cycle	14,1	1,4	15,5	17,4	2,7	20,1
Secondaire 2 Cycle	5,0	1,0	6,0	6,8	2,6	9,4
Tertiaire	7,0	0,6	7,6	6,0	1,7	7,7
Tertile de bien-être						
Faible	21,6	6,7	28,4	25,2	6,0	31,2
Intermédiaire	24,1	4,1	28,2	28,1	5,1	33,2
Elevé	14,3	2,3	16,6	16,9	5,2	22,1

¹“En union” comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme.

na = non applicable

XX: Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Besoin et demande de planification familiale

Pourcentage de femmes de 15 à 49 ans avec un besoin satisfait de planification familiale, besoins non satisfaits et demande totale de planification familiale, et pourcentage de la demande de planification familiale satisfaite par une méthode moderne, par statut matrimonial et caractéristiques sociodémographiques

Caractéristiques sociodémographiques Nombre	Toutes les femmes 3221					Femmes en union ² 2436				
	Besoins satisfaits		Besoins non satisfaits	Demande totale	Demande satisfaite par une méthode moderne	Besoins satisfaits		Besoins non satisfaits	Demande totale	Demande satisfaite par une méthode moderne
	Toutes méthodes	Méthodes modernes ¹				Toutes méthodes	Méthodes modernes ¹			
Total	22,9	21,9	24,4	47,3	46,3	25,4	24,5	28,8	54,3	45,2
Age										
15–19	10,0	9,8	16,4	26,4	37,0	16,5	16,5	26,6	43,0	38,2
20–24	27,4	25,6	28,5	55,9	45,8	24,6	23,6	33,4	58,0	40,7
25–29	28,0	27,8	27,9	55,9	49,7	26,8	26,6	28,9	55,8	47,6
30–34	30,9	29,8	27,3	58,2	51,2	31,7	30,7	29,0	60,7	50,5
35–39	27,4	25,8	29,4	56,7	45,5	28,0	26,3	30,8	58,8	44,7
40–44	24,1	22,9	26,6	50,7	45,1	26,0	24,9	29,1	55,0	45,3
45–49	12,8	11,6	13,4	26,1	44,4	13,5	12,1	15,7	29,2	41,6
Statut matrimonial										
En union ²	25,4	24,5	28,8	54,3	45,2	na	na	na	na	na
Non mariée, sexuellement active	41,4	38,7	43,2	84,6	45,7	na	na	na	na	na
Nombre d'enfants										
0–1	17,2	16,1	17,3	34,6	46,6	21,4	20,3	25,8	47,2	43,0
2–3	26,5	25,7	27,5	54,1	47,6	26,3	25,4	28,1	54,4	46,8
4 ou plus	25,6	24,8	28,8	54,4	45,5	26,5	25,7	30,5	57,0	45,1
Lieu de résidence										
Urbain	35,8	32,7	13,6	49,4	66,2	44,3	40,8	18,2	62,5	65,3
Rural	18,8	18,6	27,8	46,6	39,8	21,3	21,0	31,1	52,5	40,0
Niveau d'études										
Jamais scolarisée	19,5	19,1	28,6	48,1	39,6	20,9	20,5	30,7	51,7	39,7
Primaire	29,2	28,8	21,4	50,6	56,9	34,4	33,7	26,5	60,9	55,4
Secondaire 1er	24,0	22,4	15,5	39,5	56,8	45,4	42,3	20,1	65,5	64,6
Cycle										
Secondaire 2ème	39,8	32,8	6,0	45,8	71,6	53,5	41,1	9,4	62,9	65,4
Cycle										
Tertiaire	45,8	38,7	7,6	53,3	72,7	56,0	47,2	7,7	63,8	74,0
Tertile de bien-être économique										
Faible	19,0	18,5	28,4	47,4	39,1	21,5	20,9	31,9	53,4	39,1
Intermédiaire	18,3	18,1	28,2	46,4	39,1	20,7	20,6	32,2	52,9	39,0
Elevé	31,4	29,2	16,6	48,0	60,7	36,6	34,3	20,5	57,1	60,1

¹ Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes, et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée.

² "En union" comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme.

na = non applicable

XX: Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Intentions de fécondité

Pourcentage des femmes indiquant que leur dernière grossesse ou grossesse actuelle était désirée, non désirée ou désirée plus tard parmi les femmes ayant eu une naissance dans les 5 dernières années, par caractéristiques sociodémographiques

Caractéristiques sociodémographiques	Toutes les femmes ayant au moins une naissance				Femmes en union ayant au moins une naissance			
	1980				1878			
Nombre	Souhaitée à ce moment	Souhaitée plus tard	Non Souhaitée	Total	Souhaitée à ce moment	Souhaitée plus tard	Non Souhaitée	Total
Total	67,6	29,5	2,9	100,0	69,3	28,3	2,4	100,0
Age								
15–19	64,8	33,0	2,2	100,0	73,3	25,8	0,9	100,0
20–24	70,1	29,3	0,6	100,0	71,1	28,3	0,6	100,0
25–29	69,5	30,3	0,2	100,0	70,7	29,2	0,1	100,0
30–34	68,3	31,0	0,7	100,0	68,6	31,0	0,4	100,0
35–39	67,1	27,1	5,8	100,0	69,3	26,4	4,4	100,0
40–44	59,7	25,4	14,9	100,0	59,6	26,3	14,2	100,0
45–49	56,2	27,2	16,6	100,0	58,2	23,4	18,5	100,0
Statut matrimonial								
En union ¹	69,3	28,3	2,4	100,0	na	na	na	na
Non mariée, sexuellement active	38,1	54,7	7,2	100,0	na	na	na	na
Nombre d'enfants								
0–1	72,0	26,5	1,5	100,0	77,8	21,3	0,9	100,0
2–3	70,8	28,7	0,4	100,0	71,8	27,8	0,4	100,0
4 ou plus	63,7	31,3	5,0	100,0	64,5	31,2	4,3	100,0
Lieu de résidence								
Urbain	71,6	25,3	3,1	100,0	76,8	20,9	2,3	100,0
Rural	66,7	30,4	2,9	100,0	67,9	29,7	2,5	100,0
Education								
Jamais scolarisée	67,3	29,2	3,5	100,0	68,4	28,6	3,0	100,0
Primaire	67,1	32,2	0,8	100,0	67,4	31,9	0,7	100,0
Secondaire 1 Cycle	67,8	30,4	1,9	100,0	76,6	22,7	0,7	100,0
Secondaire 2 Cycle	90,6	7,9	1,5	100,0	96,8	1,5	1,7	100,0
Tertiaire	65,6	31,9	2,5	100,0	82,0	18,0		100,0
Tertile de bien-être économique								
Faible	60,5	34,6	4,9	100,0	61,6	33,9	4,4	100,0
Intermédiaire	67,6	31,2	1,2	100,0	68,4	30,8	0,8	100,0
Elevé	76,7	20,8	2,5	100,0	81,0	17,2	1,8	100,0

¹“En union” comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme.

na = non applicable

XX: Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Choix des méthodes

Proportion des femmes de 15 à 49 ans utilisant actuellement la contraception moderne¹ selon la personne qui a choisi la méthode de contraception, par caractéristiques sociodémographiques

Caractéristiques sociodémographiques	Choix de la femme seule	Choix de la femme avec son partenaire	Choix du prestataire seul / partenaire seul/autre	Total
Nombre	389	255	57	701
Total	55,5	36,3	8,2	100,0
Age				
15–19	48,5	40,6	11,0	100,0
20–24	60,3	32,5	7,2	100,0
25–29	43,7	48,1	8,2	100,0
30–34	57,0	35,4	7,6	100,0
35–39	60,4	30,3	9,3	100,0
40–44	65,7	26,8	7,5	100,0
45–49	64,1	29,5	6,4	100,0
Statut matrimonial				
En union ¹	55,9	36,4	7,7	100,0
Non mariée, sexuellement active	50,6	37,3	12,1	100,0
Nombre d'enfants				
0–1	51,2	37,7	11,1	100,0
2–3	55,1	37,9	7,0	100,0
4 ou plus	58,2	34,6	7,2	100,0
Lieu de résidence				
Urbain	50,2	39,0	10,8	100,0
Rural	58,4	34,8	6,8	100,0
Niveau d'études				
Jamais scolarisées	55,5	36,6	8,0	100,0
Primaire	65,3	30,0	4,6	100,0
Secondaire 1er Cycle	52,8	38,2	9,0	100,0
Secondaire 2ème Cycle	37,8	48,7	13,4	100,0
Tertiaire	30,1	47,3	22,6	100,0
Tertile de bien-être économique				
Faible	53,7	36,7	9,5	100,0
Intermédiaire	57,0	35,7	7,3	100,0
Elevé	55,8	36,3	7,8	100,0

¹Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée.

²“En union” comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme.

XX: Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Païement de frais pour les services de planification familiale

Proportion des utilisatrices de la contraception de 15 à 49 ans ayant payé des frais pour obtenir des services de planification familiale, par caractéristiques sociodémographiques

Caractéristiques sociodémographiques	Toutes les utilisatrices ¹	Utilisatrices en union ²
Nombre	706	597
Total	66,2	69,2
Age		
15–19	68,0	72,7
20–24	66,0	72,5
25–29	67,9	72,4
30–34	68,6	69,0
35–39	65,8	67,0
40–44	65,9	67,3
45–49	42,9	47,1
Statut matrimonial		
En union ²	69,2	na
Non mariée, sexuellement active	52,9	na
Nombre d'enfants		
0–1	61,9	72,8
2–3	65,9	65,8
4 ou plus	68,8	70,1
Lieu de résidence		
Urbain	57,8	65,7
Rural	70,8	70,7
Niveau d'études		
Jamais scolarisée	66,6	67,2
Primaire	71,2	73,6
Secondaire 1er Cycle	70,7	75,9
Secondaire 2ème Cycle	53,3	--
Tertiaire	29,9	--
Tertile de bien-être économique		
Faible	70,1	71,2
Intermédiaire	64,4	63,4
Elevé	64,8	72,0

¹Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée.

XX: Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

--: Moins de 25 observations non pondérées

Niveau de satisfaction des services de planification familiale

Pourcentage d'utilisatrices actuelles¹ de la contraception qui retourneraient voir le même prestataire ou le recommanderaient à une amie/famille, par caractéristiques sociodémographiques

Caractéristiques sociodémographiques	Retourneraient voir le même prestataire (%)	Recommanderaient le prestataire à une amie/famille (%)	Retourneraient voir et recommanderaient le même prestataire (%)
Nombre	704	704	704
Total	88,2	90,1	82,2
Age			
15–19	85,9	83,9	79,7
20–24	88,6	84,4	76,7
25–29	86,8	92,2	83,9
30–34	92,3	94,0	88,5
35–39	85,1	96,6	83,5
40–44	89,3	89,0	78,2
45–49	88,9	81,3	79,4
Statut matrimonial			
En union ²	90,0	91,8	84,0
Non mariée, sexuellement active	86,5	84,8	79,3
Nombre d'enfants			
0–1	85,9	83,3	77,9
2–3	93,6	91,2	86,6
4 ou plus	86,4	93,2	81,9
Lieu de résidence			
Urbain	87,8	86,8	81,8
Rural	88,4	91,9	82,4
Niveau d'études			
Jamais scolarisée	88,4	91,7	81,8
Primaire	90,1	90,7	85,8
Secondaire 1er Cycle	90,5	86,9	82,7
Secondaire 2ème Cycle	81,5	80,4	78,8
Tertiaire	73,7	85,3	68,8
Tertile de bien-être économique			
Faible	86,1	94,6	82,0
Intermédiaire	92,3	90,3	84,1
Elevé	87,1	86,9	81,1

¹Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée.

²“En union” comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme.

XX: Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Informations sur la méthode

Pourcentage des utilisatrices actuelles ou récentes de la contraception ayant été informées par leurs prestataires sur d'autres méthodes contraceptives², sur les effets secondaires, et sur les mesures à prendre en cas d'effets secondaires, par caractéristiques sociodémographiques

Caractéristiques sociodémographiques	Informées sur d'autres méthodes		Informées sur les effets secondaires		Informées sur les mesures à prendre en cas d'effets secondaires	
	Toutes les utilisatrices	Utilisatrices en union ³	Toutes les utilisatrices	Utilisatrices en union ³	Toutes les utilisatrices	Utilisatrices en union ³
Nombre	706	597	706	597	390	342
Total	62,6	65,2	55,3	57,3	90,2	91,1
Age						
15–19	57,6	58,1	42,8	37,5	82,6	--
20–24	61,6	68,5	46,4	48,7	89,1	86,9
25–29	61,7	64,8	56,1	58,7	92,3	96,3
30–34	67,3	66,1	62,7	62,1	96,7	97,1
35–39	70,9	72,4	58,8	60,0	83,3	83,3
40–44	56,9	57,3	65,6	66,8	89,4	89,9
45–49	44,1	48,4	53,3	54,6	--	--
Statut matrimonial						
En union ³	65,2	na	57,3	na	91,1	na
Non mariée, sexuellement actives	52,4	na	43,3	na	87,5	na
Nombre d'enfants						
0–1	58,4	69,8	42,1	43,5	84,8	84,3
2–3	68,1	66,3	61,2	61,2	93,0	93,4
4 ou plus	61,8	63,1	59,3	59,5	90,6	91,3
Lieu de résidence						
Urbain	65,1	72,0	53,8	59,1	86,1	88,1
Rural	61,3	62,4	56,2	56,6	92,3	92,4
Niveau d'études						
Jamais scolarisée	60,8	61,5	56,9	57,3	92,3	92,8
Primaire	67,9	70,8	58,7	59,9	87,8	88,1
Secondaire 1er Cycle	67,4	71,6	55,4	58,0	91,6	90,8
Secondaire 2ème Cycle	60,6	--	47,9	--	--	--
Tertiaire	45,1	--	21,6	--	--	--
Tertile de bien-être économique						
Faible	60,5	61,8	50,8	52,2	86,8	87,9
Intermédiaire	62,0	61,4	61,5	61,7	96,1	95,8
Elevé	64,4	70,8	54,6	58,2	88,2	89,5

¹ Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif; masculin et féminin, la méthode des jours fixes et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée.

² "Informées sur d'autres méthodes" se réfère à toutes les utilisatrices actuelles de la contraception ; "informées sur les effets secondaires" se réfère aux utilisatrices de la contraception moderne ; et "informées sur les mesures à prendre en cas d'effets secondaires" se réfère aux utilisatrices actuelles de la contraception moderne ayant indiqué avoir été informées sur les effets secondaires.

³ "En union" comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme.

na = non applicable

XX: Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

--: Moins de 25 observations non pondérées

Informations reçues sur les méthodes contraceptives de la planification familiale

Pourcentage de femmes de 15 à 49 ans indiquant avoir reçu la visite d'un agent de santé qui lui a parlé de la planification familiale au cours des 12 derniers mois, par caractéristiques sociodémographiques

Caractéristiques sociodémographiques	Visite d'un agent de santé qui a parlé de la planification familiale		Visite dans une structure sanitaire où un prestataire a parlé de la planification familiale		Informations reçues sur la planification familiale soit lors d'une visite d'un agent de santé, soit dans une structure sanitaire	
	Toutes les femmes	Femmes en union ¹	Toutes les femmes	Femmes en union ¹	Toutes les femmes	Femmes en union ¹
Nombre	3221	2436	3221	2436	3221	2436
Total	19,6	22,7	24,5	30,4	34,9	41,5
Age						
15–19	13,5	21,3	11,6	30,2	20,5	39,6
20–24	19,4	22,8	27,6	31,1	37,4	42,3
25–29	24,1	25,6	33,6	35,5	45,3	47,8
30–34	25,1	26,3	34,8	36,5	45,8	47,5
35–39	20,6	20,7	27,5	28,6	38,4	39,5
40–44	21,4	21,8	25,0	27,5	36,0	37,6
45–49	12,6	13,7	8,1	9,5	18,3	20,4
Statut matrimonial						
En union ¹	22,7	na	30,4	na	41,5	na
Non mariée, sexuellement active	13,9	na	10,1	na	21,6	na
Nombre d'enfants						
0–1	13,4	18,9	14,0	26,1	23,4	37,5
2–3	23,1	23,9	34,3	34,9	44,1	45,0
4 ou plus	23,0	23,5	28,1	29,6	39,7	41,0
Lieu de résidence						
Urbain	10,2	12,4	19,2	26,2	25,4	32,7
Rural	22,5	24,9	26,2	31,3	37,8	43,4
Niveau d'études						
Jamais scolarisée	22,1	23,6	26,5	29,2	37,4	40,5
Primaire	17,8	22,6	27,2	35,4	36,7	47,0
Secondaire 1er Cycle	14,4	18,1	16,1	33,9	26,3	43,2
Secondaire 2ème Cycle	8,0	13,1	18,5	32,0	21,5	34,7
Tertiaire	8,1	1,7	12,5	22,9	20,6	24,5
Tertile de bien-être économique						
Faible	22,4	25,5	24,3	29,1	36,6	42,6
Intermédiaire	21,8	24,0	27,2	31,9	37,3	42,1
Elevé	14,5	17,4	22,2	30,3	30,8	39,1

¹“En union” comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme.

na = non applicable

XX: Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Erreurs de sondage

Variable	Estimation	Population de référence
Utilisatrices actuelles de méthodes modernes	Proportion	Toutes les femmes de 15 à 49 ans Femmes en union de 15 à 49 ans
Utilisatrices actuelles de méthodes traditionnelles	Proportion	Toutes les femmes de 15 à 49 ans Femmes en union de 15 à 49 ans
Utilisatrices actuelles de la contraception	Proportion	Toutes les femmes de 15 à 49 ans Femmes en union de 15 à 49 ans
Utilisatrices actuelles de l'injectable	Proportion	Toutes les femmes de 15 à 49 ans Femmes en union de 15 à 49 ans
Utilisatrices actuelles du préservatif masculin	Proportion	Toutes les femmes de 15 à 49 ans Femmes en union de 15 à 49 ans
Utilisatrices actuelles de l'implant	Proportion	Toutes les femmes de 15 à 49 ans Femmes en union de 15 à 49 ans
A choisi la méthode elle-même ou avec son partenaire/prestataire dans les 12 derniers mois	Proportion	Toutes les femmes de 15 à 49 ans Femmes en union de 15 à 49 ans
A payé pour un service de planification familiale dans les 12 derniers mois	Proportion	Toutes les femmes de 15 à 49 ans Femmes en union de 15 à 49 ans
A été informée par son prestataire sur d'autres méthodes contraceptives	Proportion	Toutes les femmes de 15 à 49 ans Femmes en union de 15 à 49 ans
A été informée par son prestataire sur les effets secondaires	Proportion	Toutes les femmes de 15 à 49 ans Femmes en union de 15 à 49 ans
Satisfaite de son prestataire : retournerait le voir et le recommanderait à une amie ou un membre de sa famille	Proportion	Toutes les femmes de 15 à 49 ans Femmes en union de 15 à 49 ans
Visite d'un agent de santé qui a parlé de la planification familiale dans les 12 derniers mois	Proportion	Toutes les femmes de 15 à 49 ans Femmes en union de 15 à 49 ans