

# PMA BURKINA FASO (HAUTS-BASSINS)

Résultats de l'enquête transversale de la Phase 3

Décembre 2021-Février 2022



## PRINCIPAUX RÉSULTATS



Le taux de prévalence contraceptive moderne (TPCm) parmi les femmes en union est de **39%** dans les Hauts-Bassins. Il est plus élevé en milieu urbain qu'en milieu rural.



Dans les milieux urbains des Hauts-Bassins, une plus faible proportion de femmes utilisent des méthodes à longue durée d'action par rapport aux méthodes à courte durée d'action. En revanche, dans les milieux ruraux des Hauts-Bassins, une plus grande proportion de femmes utilisent des méthodes à longue durée d'action par rapport aux méthodes à courte durée d'action.




Les ruptures actuelles ou récentes de stocks de la pilule et du préservatif masculin ont fortement diminué entre la Phase 2 et la Phase 3, tant au niveau national que dans les milieux urbains et ruraux des Hauts-Bassins. En revanche, celles du DIU y ont augmenté entre les deux Phases.

## SECTION 1 : UTILISATION DE LA CONTRACEPTION, DYNAMIQUE ET DEMANDE CONTRACEPTIVE

### PRÉVALENCE CONTRACEPTIVE MODERNE


Pourcentage de femmes âgées de 15-49 ans qui utilisent actuellement une méthode contraceptive moderne (TPCm) par statut matrimonial



- Femmes en union (PMA Hauts-Bassins Phase 3, n=1 008)
- Femmes non mariées, sexuellement actives (PMA Hauts-Bassins Phase 3, n=116)
- Toutes les femmes (PMA Hauts-Bassins Phase 3, n=1 502)

### PRÉVALENCE CONTRACEPTIVE MODERNE


Pourcentage de femmes âgées de 15-49 ans qui utilisent actuellement une méthode contraceptive moderne (TPCm) par statut matrimonial selon les milieux de résidence



- Femmes en union (PMA Hauts-Bassins Phase 3, n=1 008)
- Femmes non mariées, sexuellement actives (PMA Hauts-Bassins Phase 3, n=116)
- Toutes les femmes (PMA Hauts-Bassins Phase 3, n=1 502)


## TAUX DE PRÉVALENCE CONTRACEPTIVE PAR TYPE DE METHODES

Pourcentage de toutes les femmes âgées de 15-49 ans qui utilisent actuellement une méthode contraceptive, par type de méthode (PMA Hauts-Bassins Phase 3, n=1 502)




## TAUX DE PRÉVALENCE CONTRACEPTIVE PAR TYPE DE METHODES

Pourcentage de toutes les femmes âgées de 15-49 ans qui utilisent actuellement une méthode contraceptive, par type de méthode et par milieu de résidence (PMA Hauts-Bassins Phase 3, n=1 502)




## TENDANCES DANS LA DISTRIBUTION DES MÉTHODES CONTRACEPTIVES MODERNES

Pourcentage de toutes les femmes âgées de 15-49 ans qui utilisent des méthodes contraceptives modernes, par méthode et par année (PMA Hauts-Bassins Phase 3, n=574)




## DISTRIBUTION DES MÉTHODES CONTRACEPTIVES MODERNES

Pourcentage d'utilisatrices des méthodes contraceptives modernes âgées de 15-49 ans, par méthode et par milieu de résidence




## UTILISATION DES MÉTHODES CONTRACEPTIVES, BESOINS NON SATISFAITS ET DEMANDE CONTRACEPTIVE SATISFAITE PAR UNE MÉTHODE MODERNE

Pourcentage de toutes les femmes âgées de 15-49 ans qui utilisent une méthode contraceptive par type de méthodes, pourcentage de celles ayant les besoins non satisfaits, et pourcentage de celles ayant une demande contraceptive satisfaite par une méthode moderne (PMA Hauts-Bassins Phase 3, n=1 502)



Pourcentage de toutes les femmes âgées de 15-49 ans qui utilisent une méthode contraceptive par type de méthodes, pourcentage de celles ayant les besoins non satisfaits, et pourcentage de celles ayant une demande contraceptive satisfaite par une méthode moderne (PMA Hauts-Bassins Phase 3, n=1 502)




- Méthodes modernes
- Méthodes traditionnelles
- Besoins non satisfaits pour limiter les naissances
- Besoins non satisfaits pour espacer les naissances
- Demande contraceptive satisfaite par une méthode moderne

La demande contraceptive satisfaite par une méthode moderne est le quotient des utilisatrices de méthodes contraceptives modernes par la somme des femmes utilisant une méthode contraceptive ou ayant des besoins non satisfaits.

### INTENTION DE LA NAISSANCE LA PLUS RÉCENTE / LA GROSSESSE ACTUELLE

Distribution (pourcentage) des femmes selon l'intention de leur dernière naissance ou leur grossesse actuelle (n=763)



### INTENTION D'UTILISER LA CONTRACEPTION AU COURS DES 12 PROCHAINS MOIS

Pourcentage de toutes les femmes âgées de 15-49 ans qui n'utilisent pas actuellement une méthode contraceptive, mais qui ont l'intention d'en utiliser au cours des 12 prochains mois (n=813)




## PRINCIPAUX RÉSULTATS POUR LA SECTION 1: UTILISATION DE LA CONTRACEPTION, DYNAMIQUES ET DEMANDE CONTRACEPTIVE

- Tandis que l'utilisation des méthodes contraceptives à courte durée d'action a augmenté de **17%** à **19%** entre 2020 et 2022 dans les Hauts-Bassins, celle des méthodes à longue durée d'action y a diminué de **19%** à **17%** pendant la même période.
- La demande contraceptive satisfaite par une méthode moderne chez les femmes résidant dans les Hauts-Bassins est au-dessus de la moyenne nationale.
- Plus d'une femme sur quatre (**26%**) déclarent que leur naissance récente ou grossesse actuelle est non souhaitée dont **23%** auraient préféré qu'elle survienne plus tard.

### INDICE INFORMATION MÉTHODE PLUS (MII+)

Pourcentage de femmes qui ont été conseillées sur les effets secondaires, sur que faire en cas d'effets secondaires, sur d'autres méthodes et sur la possibilité de changer de méthode (n=546)




Pourcentage de femmes qui ont répondu « Oui » à toutes les quatre questions



On a demandé seulement aux femmes qui ont déclaré avoir été informées des effets secondaires possibles si elles avaient été informées de ce qu'il fallait faire en cas d'effets secondaires.

### A DISCUTÉ DE LA PF AVEC UN PRESTATAIRE AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS

Pourcentage de femmes qui ont reçu des informations sur la PF d'un prestataire ou d'un agent de santé communautaire, par âge



### PRINCIPAUX RÉSULTATS POUR LA SECTION 2 : QUALITÉ DES SERVICES DE LA PF ET DU COUNSELING

- Près de la moitié (49%) des utilisatrices actuelles de méthodes contraceptives modernes n'ont pas été conseillées sur les possibles effets secondaires ou problèmes liés à la méthode choisie au moment de la consultation.
- Au cours des 12 derniers mois précédant l'enquête, la proportion de femmes qui ont reçu des informations sur la PF de la part des prestataires de santé est au moins deux fois plus élevée chez les femmes plus âgées que chez les adolescentes.
- Seulement 33% de l'ensemble des utilisatrices actuelles de méthodes contraceptives ont reçu un counseling complet de la part des prestataires.

## IMPLICATION DU PARTENAIRE DANS LES DÉCISIONS CONCERNANT LA PF

Pourcentage de femmes qui utilisent actuellement une méthode moderne sous le contrôle de la femme et qui sont d'accord avec les déclarations suivantes, par âge et par éducation (n=432)



### Par âge



### Par éducation



Les méthodes modernes sous le contrôle de la femme incluent toutes les méthodes modernes sauf la stérilisation masculine et les préservatifs masculins

Pourcentage de femmes qui utilisent actuellement une méthode moderne sous le contrôle de la femme et qui sont d'accord avec la déclaration suivante, par âge et par éducation (n=431)



### Par âge




### Par éducation




Les méthodes modernes sous le contrôle de la femme incluent toutes les méthodes modernes sauf la stérilisation masculine et les préservatifs masculins


Pourcentage de femmes qui utilisent actuellement une méthode PF et qui sont d'accord avec la déclaration suivante, par âge et par éducation (n=503)



### Par âge




### Par éducation




Pourcentage des femmes qui n'utilisent pas actuellement la PF et qui sont d'accord avec la déclaration suivante, par âge et par éducation (n=810)

Diriez-vous que la décision de ne pas utiliser une méthode contraceptive était principalement la vôtre ?




- Décision prise principalement par l'enquêtée
- Décision prise principalement par le mari/conjoint
- Décision prise ensemble
- Autre

### Par âge




### Par éducation



## COERCITION LIÉE À LA GROSSESSE


Pourcentage de femmes en union qui déclarent que leur partenaire a essayé de les forcer ou de faire pression sur elles pour qu'elles tombent enceintes dans les 12 derniers mois (n=1 007)



Pourcentage de femmes en union qui déclarent que leur partenaire leur a fait se sentir mal pour avoir voulu utiliser une méthode contraceptive pour retarder ou éviter une grossesse au cours des 12 derniers mois (n=1 006)



Pourcentage de femmes actuellement mariées qui déclarent que leur partenaire a déclaré qu'il les quitterait si elles ne tombaient pas enceintes au cours des 12 derniers mois (n=1 007)



Pourcentage de femmes en union qui déclarent que leur partenaire leur a retiré sa méthode contraceptive ou l'a empêchée d'aller en clinique au cours des 12 derniers mois (n=1 006)




## PRINCIPAUX RÉSULTATS POUR LA SECTION 3 : DYNAMIQUES CONTRACEPTIVES AU SEIN DU COUPLE

- Parmi les femmes utilisant une méthode contraceptive moderne sous leur contrôle, **11%** déclarent que leur mari/partenaire ne sait pas qu'elles utilisent une méthode contraceptive.
- Vingt-un pour cent des femmes qui utilisent une méthode contraceptive sous leur contrôle affirment n'avoir pas discuté avec leur conjoint ou partenaire de la décision de retarder ou d'éviter une grossesse avant de commencer à utiliser leur méthode actuelle, avec une proportion plus élevée chez les adolescentes.
- Seulement **39%** des utilisatrices actuelles affirment que la décision d'utiliser la contraception a été conjointement prise avec le conjoint/partenaire.

## SECTION 4 : SITES DE PRESTATIONS DE SANTÉ


### ÉVOLUTION DE LA DISPONIBILITÉ DES MÉTHODES CONTRACEPTIVES : DIU

Sites de prestations de santé publics (Hauts-Bassins n=42)




### ÉVOLUTION DE LA DISPONIBILITÉ DES MÉTHODES CONTRACEPTIVES : IMPLANT

Sites de prestations de santé publics (Hauts-Bassins n=42)




## ÉVOLUTION DE LA DISPONIBILITÉ DES MÉTHODES CONTRACEPTIVES : INJECTABLE

Sites de prestations de santé publics (Hauts-Bassins n=42)




## ÉVOLUTION DE LA DISPONIBILITÉ DES MÉTHODES CONTRACEPTIVES : PILULE

Sites de prestations de santé publics (Hauts-Bassins n=42)



# ÉVOLUTION DE LA DISPONIBILITÉ DES MÉTHODES CONTRACEPTIVES : PRÉSERVATIF MASCULIN

Sites de prestations de santé publics (Hauts-Bassins n=42)



## PRINCIPALES RAISONS DES ÉPISODES DE RUPTURES DE STOCK DE TOUTE MÉTHODE PAR TYPE D'ÉTABLISSEMENT

Sites de prestations de santé publics (n=8 épisodes)



**63%**  
Les produits ont été commandés mais n'ont pas été livrés



**38%**  
Les produits n'ont pas été commandés



**75%**  
Les produits ont été commandés mais n'ont pas été livrés




**25%**  
Les produits n'ont pas été commandés


Réponses possibles ont été: « Les produits n'ont pas été commandés », « Les produits ont été commandés mais n'ont pas été livrés », « Les produits n'ont pas été commandés en quantité suffisante », « Les produits ont été commandés mais livrés en quantité insuffisante », « Une augmentation inattendue de la consommation », « Rupture de stock due à la perturbation de la COVID-19 » et « Autre ».

## CAPACITÉ OPÉRATIONNELLE DE SITES DE PRESTATION DE SANTÉ

Pourcentage de sites de prestation de santé qui offrent les implants et qui ont un prestataire formé et les instruments / matériels nécessaires pour l'insertion / le retrait d'implants (n=44)



Pourcentage d'établissements qui offrent le DIU et qui ont un prestataire formé et les instruments / matériels nécessaires pour l'insertion / le retrait du DIU (n=41)



**80%**

*d'utilisatrices  
d'une méthode  
contraceptive moderne  
l'ont obtenu auprès d'un  
site de prestation de santé  
public (n=546)*

#### **PRINCIPAUX RÉSULTATS POUR LA SECTION 4 : SITES DE PRESTATION DE SANTÉ**

- *Dans les sites de prestation de santé publics des milieux urbains et ruraux des Hauts-Bassins, les ruptures actuelles ou récentes de stocks de la pilule et du préservatif masculin ont fortement diminué entre la Phase 2 et la Phase 3.*
- *La raison la plus fréquemment citée pour expliquer les ruptures de stocks des méthodes contraceptives dans les sites de prestation de santé publics est que les produits ont été commandés mais n'ont pas été livrés.*
- *Alors que **91%** des sites de prestation de santé offrent l'implant et ont un prestataire formé et les instruments/matériels nécessaires pour son insertion ou son retrait, ce pourcentage est seulement de **32%** pour le DIU.*

## TABLEAUX : LA PRÉVALENCE CONTRACEPTIVE ET LES BESOINS NON SATISFITS

### TOUTES LES FEMMES

Source de données	Vague / Phase	Collecte de données	Échantillon des femmes	TPC			TPCm			Besoins non satisfaits de PF		
				TPC%	Erreur-type	95% Intervalle de confiance	TPCm%	Erreur-type	95% Intervalle de confiance	Besoins non satisfaits (%)	Erreur-type	95% Intervalle de confiance
PMA Hauts-Bassins	Phase 1	déc 2019 -fév 2020	1 627	37.30	1.88	33.59 41.16	35.82	1.87	32.13 39.68	14.94	1.35	12.43 17.87
PMA Hauts-Bassins	Phase 2	déc 2020 -mars 2021	1 583	38.64	2.13	34.45 43.01	34.93	1.88	31.22 38.82	14.55	1.48	11.81 17.80
PMA Hauts-Bassins	Phase 3	déc 2021 -fév 2022	1 502	38.79	2.55	33.80 44.04	35.62	2.29	31.15 40.36	12.39	1.29	10.02 15.22

### FEMMES EN UNION

Source de données	Vague / Phase	Collecte de données	Échantillon des femmes	TPC			TPCm			Besoins non satisfaits de PF		
				TPC%	Erreur-type	95% Intervalle de confiance	TPCm%	Erreur-type	95% Intervalle de confiance	Besoins non satisfaits (%)	Erreur-type	95% Intervalle de confiance
PMA Hauts-Bassins	Phase 1	déc 2019 -fév 2020	1 011	41.24	2.57	36.17 46.50	39.60	2.53	34.62 44.80	18.87	1.58	15.88 22.26
PMA Hauts-Bassins	Phase 2	déc 2020 -mars 2021	1 068	41.14	2.85	35.53 46.99	37.93	2.72	32.62 43.55	18.37	1.70	15.19 22.05
PMA Hauts-Bassins	Phase 3	déc 2021 -fév 2022	1 008	42.50	3.26	36.11 49.16	39.28	3.11	33.22 45.68	16.33	1.58	13.39 19.78

PMA Burkina Faso (Hauts-Bassins) collecte des informations sur les connaissances, les pratiques et la couverture des services de planification familiale dans 44 zones de dénombrement en utilisant un plan de sondage en grappes stratifié par le lieu de résidence en milieu urbain ou rural. Les résultats sont représentatifs au niveau régional. Les données ont été collectées entre décembre et février 2022 auprès de 1361 ménages (avec un taux de réponse de 97,3%), 1502 femmes âgées de 15 à 49 ans (taux de réponse : 93,6%), et 51 sites de prestation de santé (taux de réponse : 96,2%). Pour plus d'information sur l'échantillonnage et les bases de données complètes, consultez : [www.pmadata.org/countries/burkina-faso](http://www.pmadata.org/countries/burkina-faso).

PMA utilise la technologie mobile et des enquêtrices résidentes pour la collecte de données afin de réaliser rapidement des enquêtes de suivi des indicateurs clés de la planification familiale et de la santé en Afrique et en Asie. PMA Burkina Faso est dirigé par l'Institut Supérieur des Sciences de la Population de l'Université Joseph Ki-Zerbo, Ouagadougou, Burkina Faso. La stratégie et l'appui global sont fournis par l'Institut Bill & Melinda Gates pour la Population et la Santé de la Reproduction de l'Université de Johns Hopkins et Jhpiego. Les financements proviennent de la Fondation Bill & Melinda Gates.